

المعيار
الدولي رقم
39

عربي

المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 36

الحركة الدولية للأخشاب

تركت هذه الصفحة فارغة عمدأً

المعايير الدولية
لتدابير الصحة النباتية

المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 39
الحركة الدولية للأخشاب

صدر عن أمانة
الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات
اعتمد في 2017، نشر في 2018

الأوصاف المستخدمة في هذه المواد الإعلامية وطريقة عرضها لا تغير عن أي رأي خاص لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في ما يتعلق بالوضع القانوني أو التموي لأي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة، أو في ما يتعلق بسلطتها أو بتعيين حدودها وتخومها ولا تغير الاشارة إلى سركات محددة أو منتجات بعض المصنعين، سواء كانت مرخصة أم لا، عن دعم أو توصية من جانب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة أو تقضيلها على مثيلاتها مما لم يرد ذكره.

تمثل وجهات النظر الواردة في هذه المواد الإعلامية الرؤية الشخصية للمؤلف (المؤلفين)، ولا تخس باي حال وجهات نظر منظمة الأغذية والزراعة أو سياساتها.

© FAO, 2017

تشجع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة استخدام هذه المواد الإعلامية واستنساخها ونشرها، وما لم يذكر خلاف ذلك، يمكن نسخ هذه المواد وطبعها وتحمليها بغرض الدراسات الخاصة والابحاث والاطراف التعليمية، أو الاستخدام في منتجات أو خدمات غير تجارية، على أن يشار إلى أن المنظمة هي المصدر، واحترام حقوق النشر، وعدم افتراض موافقة المنظمة على آراء المستخدمين وعلى المنتجات أو الخدمات باي شكل من الأشكال.

ينبغي توجيه جميع طلبات الحصول على حقوق الترجمة والتصرف وإعادة النسخ بالإضافة إلى حقوق الاستخدام التجاري الأخرى إلى العنوان التالي: www.fao.org/contact-us/licence-request أو إلى: copyright@fao.org

تتاح المنتجات الإعلامية للمنظمة على موقعها التالي: www.fao.org/publications، ويمكن شراؤها بإرسال الطلبات إلى: publications-sales@fao.org

وعندما يتم نسخ هذا المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية، تجدر الإشارة إلى أن النسخ المعدنة الحالية للمعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية متاحة لتنزيلها على الموقع الإلكتروني: www.ippc.int.

تاريخ المطبوع

هذا ليس جزءاً رسمياً من المعيار

- 2007-03 قيام الدورة الثانية لهيئة تدابير الصحة النباتية
باصافة موضوع الحركة الدولية للأختاب (2006-029)
2007-11 قيام لجنة المعايير بالموافقة على مشروع المعايير لعرضه على مشاركة الأعضاء
2007-12 تقديم مشروع المعايير إلى مشاركة الأعضاء
2008-05 قيام لجنة المعايير بالموافقة على المعايير 46
2008-12 قيام الفريق التقني المعنى بالحجر الحرجي بصياغة المعيار الدولي
2009-07 قيام الفريق التقني المعنى بالحجر الحرجي بتنقيح مشروع المعيار الدولي
2010-04 قيام لجنة المعايير بتنقيح مشروع المعيار الدولي
2010-09 قيام الفريق التقني المعنى بالحجر الحرجي بتنقيح مشروع المعيار الدولي
2012-11 قيام لجنة المعايير باستعراض مشروع المعيار الدولي والإدلاء بتعليقاتهم ثم إرساله إلى المشرف
2013-05 قيام لجنة المعايير بمراجعة مشروع المعيار الدولي وتنقيحه والمراجعة عليه من أجل عرضه على مشاركة الأعضاء
2013-07 انعقاد مشاركة الأعضاء
2014-02 قيام المشرف بتنقيح مشروع لجنة المعايير بتنقيح
2014-05 قيام الدورة السابعة لجنة المعايير بتنقيح مشروع الأعضاء والموافقة عليه لبدء فترة إبداء التعليقات على الشواغل الجوهرية
2014-06 فترة إبداء التعليقات على الشواغل الجوهرية
2014-10-2014 بعد فترة إبداء التعليقات على الشواغل الجوهرية
- 2014-04: الدورة الثالثة عشر لهيئة تدابير الصحة النباتية (CPM-13) في 2018 أحبطت علمًا بأن مجموعة مراجعة اللغات راجعت هذا المعيار.
- 2018-01 راجحت خدمات الترجمة التابعة لمجموعة مراجعة اللغة الخاصة باللغة العربية هذا المعيار وقامت أمانة الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات بدمج التعديلات وفقاً لذلك.
- 2018-04: الدورة الثالثة عشر لهيئة تدابير الصحة النباتية (CPM-13) في 2018 أحبطت علمًا بأن مجموعة مراجعة اللغات راجعت هذا المعيار.

المحتويات

4	الاعتماد
4	مقدمة
4	النطاق
4	المراجع
5	التعاريف
5	عرض عام للمتطلبات
5	معلومات أساسية
6	التأثير على التنوع البيولوجي وعلى البيئة
6	المتطلبات
6	-1 مخاطر الآفات المرتبطة بالسلع الخشبية
7	الأخشاب المستديرة
8	الأخشاب المنشورة
9	مواد خشبية ناتجة عن التجهيز الميكانيكي للخشب (باستثناء النشر)
9	رفاقات الخشب
9	مخلفات الخشب
10	نشرة الخشب وصوف الخشب
10	-2 تدابير الصحة النباتية
11	إزالة القشرة
11	الخشب منزوع القشرة
12	الخشب المقشور
12	المعالجات
13	قطع الخشب إلى رفاقات
13	التقنيات والاختيارات
13	المناطق الحالية من الآفات وأماكن الإنتاج الحالي من الآفات ومناطق ينخفض فيها انتشار الآفات
13	نهج النظم
14	-3 الاستخدام المقصود
14	-4 عدم الامتثال
15	المرفق 1: صور توضيحية للقشرة والخشب
17	المرفق 2: المعالجات التي يمكن استخدامها للتخفيف من مخاطر الآفات على الخشب
17	التبييض
17	الرش أو الغمس
17	التشبع بالضغط الكيميائي
18	المعالجة بالحرارة
18	التجفيف في القماش
18	التجفيف بالهواء
19	التشعيع
19	المعالجة بالجو المعدل
19	المراجع

الاعتماد

اعتمد هذا المعيار من قبل هيئة تدابير الصحة النباتية في دورتها الثانية عشرة في أبريل/نيسان 2017.

مقدمة

النطاق

يقدم هذا المعيار توجيهات حول تقييم مخاطر الآفات التي تتهدّد الأخشاب ويصنف تدابير الصحة النباتية التي يمكن استخدامها لخفض مخاطر دخول وانتشار الآفات الخاضعة للحجر الزراعي والمرتبطة بالحركة الدولية للأخشاب، خاصة تلك التي تصيب الأشجار.

يغطي هذا المعيار فقط سلع الخشب الخام والمواد الناتجة عن التجهيز الميكانيكي للأخشاب: (1) الأخشاب المستدير والأخشاب المنشورة (بالقشرة أو بدونها)؛ و(2) المواد الناتجة عن التجهيز الميكانيكي للأخشاب مثل رقاقات الخشب والنشرارة وصوف الخشب ومخلفات الخشب (وجميعها بالقشرة أو بدونها). ويشمل هذا المعيار خشب الراتنجيات وخشب كاسيت البذور (أي ذوات الفلكتين وبعض ذوات الفلقة الواحدة كالنخيل)، لكنه لا يشمل الخيزران والخيزران الهندي.

تدرج مواد التعبئة الخشبية في نطاق المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 15 (إضاع مواد التعبئة الخشبية في التجارة الدولية)، ولذا فإنها ليست مشمولة بهذا المعيار.

المنتجات المصنعة من الخشب (كالأثاث) والمواد الخشبية المجهزة (مثل، الخشب المعالج بالضغط أو باستخدام الغراء أو الحرارة) والمصنوعات اليدوية الخشبية ليست مشمولة بهذا المعيار.

قد يحمل الخشب أيضاً آفات ملوثة، غير أن هذه ليست مشمولة بهذا المعيار.

المراجع

يشير المعيار الحالي أيضاً إلى معايير دولية أخرى لتدابير الصحة النباتية، وهي متاحة على البوابة الدولية للصحة النباتية <https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/ispms>.

منظمة الأغذية والزراعة، 2009. الاستعراض العالمي للآفات والأمراض الحرجية، الوثيقة الحرجية 156 الصادرة عن المنظمة، روما، منظمة الأغذية والزراعة، 222 صفحة.

منظمة الأغذية والزراعة، 2011. دليل تطبيق معايير الصحة النباتية في القطاع الحرجي، الوثيقة الحرجية 164 الصادرة عن المنظمة، روما، منظمة الأغذية والزراعة، 101 صفحة

التعريف

يمكن الاطلاع على تعاريف مصطلحات الصحة النباتية في المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 5 (مسرد مصطلحات الصحة النباتية).

عرض عام للمتطلبات

تنقاوت مخاطر الآفات في ما بين سلع الأخشاب، من مثل الأخشاب المستديرة والأخشاب المنشورة والمواد الخشبية الناتجة عن التجهيز الميكانيكي، تبعاً لمستوى التجهيز الذي كان الخشب قد خضع له.

ينبغي أن تستخدمن المنظمات الوطنية لوقاية النباتات تحليل مخاطر الآفات (PRA) لتقديم تعليل فني لمتطلبات الصحة النباتية للسلع المستوردة بشأن الآفات الخاضعة للحجر الزراعي المرتبطة بالحركة الدولية للأخشاب.

ينبغي تطبيق تدابير الصحة النباتية لإدارة مخاطر الآفات المرتبطة بالخشب، بما في ذلك نزع القشرة والمعالجة والتقطيع والتفتيش بما يتاسب مع مخاطر الآفات التي يتم تحديدها.

قد تطلب المنظمة الوطنية لوقاية النباتات في البلد المستورد، كأحد متطلبات الصحة النباتية، تدابيرًا من تدابير الصحة النباتية مفرداً أو مجموعة تدابير بموجب نهج النظم.

معلومات أساسية

قد يحمل الخشب المنتج من أشجار أو نباتات خشبية مصابة آفات. وقد تتمكن هذه الآفات بعدئذ من إصابة الأشجار الواقعة في منطقة تحليل مخاطر الآفات. وتلك هي مخاطر الآفات التي يتناولها بشكل رئيسي هذا المعيار.

قد يصاب الخشب ببعض الآفات أيضاً بعد حصاده. وترتبط مخاطر مثل هذه الإصابة ارتباطاً وثيقاً بحالة الخشب (مثل الحجم وجود القشرة أو غيابها ونسبة الرطوبة) والتعرض للآفات بعد الحصاد.

تتضمن الآفات التي تبين تاريخياً أنها تنتقل مع الأخشاب في حركة التجارة الدولية وتتوطن في مناطق جديدة: الحشرات التي تبيض على القشرة وخافس القشرة ودبابير الخشب وأكلات الخشب والديدان الأسطوانية الساكنة في الخشب وبعض أنواع الفطريات ذات مراحل الانتشار التي يمكن أن تنتقل مع الخشب. ولذا، فإن الخشب (ببشرة أو بدونها) الذي ينتقل مع حركة التجارة الدولية سبيل محتمل لإدخال الآفات الخاضعة للحجر الزراعي وانتشارها.

ينقل الخشب عادة على شكل أخشاب مستديرة أو أخشاب منشورة أو أخشاب مجهزة ميكانيكياً. وتعتمد مخاطر الآفات الناجمة عن سلعة خشبية ما على مجموعة من الخصائص من مثل نوع السلعة ومستوى التجهيز وجود القشرة أو غيابها، كما على عوامل من مثل منشاً الخشب وعمره وأنواعه واستخدامه المقصود أو أية معالجات تعرض لها.

ينقل الخشب عادة حول العالم إلى وجهة محددة واستخدام مقصود محدد. ونظراً لتواءر الارتباطات بين مجموعات آفات رئيسية وسلع خشبية رئيسية، من المهم تقديم الإرشاد والتوجيه بشأن تدابير الصحة النباتية. ويقدم هذا المعيار الإرشاد للإدارة الفعالة لمخاطر الآفات الخاضعة للحجر الزراعي ولمواومة استخدام تدابير الصحة النباتية المناسبة.

يوفر منشور صادر عن المنظمة بعنوان الاستعراض العالمي للآفات والأمراض الحرجة (2009) معلومات عن بعض الآفات الرئيسية التي تصيب الغابات في العالم ويقدم دليلاً لتطبيق

معايير الصحة النباتية في القطاع الحرجي (2011) معلومات عن أفضل الممارسات الإدارية التي تقلل مخاطر الآفات أثناء نمو وحصاد ونقل الأخشاب عن طريق البحر.

لتمييز بين الخشب والقشرة بحسب ما هو متبع في هذا المعيار، يورد المرفق 1 رسمياً وصوراً فوتوغرافية لعينة مقطوع مستعرض للخشب المستدير والخشب المنشور.

التأثير على التنوع البيولوجي وعلى البيئة

يعتبر تنفيذ هذا المعيار كفياً إلى حد كبير بتخفيض احتمال دخول الآفات الخاضعة للحجر الزراعي وانتشارها، ما يساهم في صحة الأشجار وفي حماية التنوع البيولوجي للغابات. وقد يكون بعض المعالجات تأثير سلبي على البيئة، ولذا تشجع البلدان على الترويج لاستخدام تدابير للصحة النباتية لها أقل تأثير سلبي ممكن على البيئة.

المطلبات

1- مخاطر الآفات المرتبطة بالسلع الخشبية

تنقاوت مخاطر الآفات المتعلقة بالسلع الخشبية التي يتناولها هذا المعيار بتنقاوت منشأ الأخشاب وأنواعها؛ وخصائصها من مثل مستوى تجهيزها أو المعالجة التي خضعت لها ووجود القشرة أو غيابها؛ والغرض من استخدامها.

يصنف هذا المعيار مخاطر الآفات العامة المتعلقة بكل سلعة خشبية، وذلك بتبيان مجموعات الآفات الرئيسية المرتبطة بها. وبالإضافة إلى عوامل المخاطر المذكورة أعلاه، قد تعتمد مخاطر الآفات المرتبطة بسلعة خشبية ما أيضاً على عوامل من مثل عمر الخشب وحجمه ومحتواه من الرطوبة وحالة الآفة في مكان المنشأ ومكان الوجهة ومدة ووسيلة النقل.

ينبغي ألا تُشترط تدابير الصحة النباتية دون تبرير فني مناسب قائم على تحليل لمخاطر الآفات (كما هو موصوف في المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 2 (إطار لتحليل مخاطر الآفات) والمعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 11 (تحليل مخاطر الآفات الحجرية)، مع مراعاة اعتبارات مثل:

- حالة الآفة في منشأ الأخشاب
- درجة التجهيز قبل التصدير
- قدرة الآفة على الصمود على الخشب أو داخله
- الاستخدام المقصود للخشب
- احتمال استثباب الآفة في المنطقة المشمولة بتحليل مخاطر الآفات، بما في ذلك وجود ناقل إذا كان انتشار الآفة يتطلب ذلك.

قد يكون الخشب مصاباً بآفات موجودة في منطقة المنشأ خلال فترة النمو أو الحصاد. ويمكن لعوامل عدة أن تؤثر على قدرة الآفة على إصابة الأشجار أو الخشب. وقد تؤثر تلك العوامل أيضاً على قدرة الآفة على الصمود على الخشب الممحض أو داخله، فتؤثر وبالتالي على ارتباط مخاطر الآفة بالخشب. وتلك العوامل هي: تفشي الآفات في منطقة المنشأ وممارسات إدارة الغابات والظروف خلال النقل وفترة التخزين والمكان والظروف والمعالجات المطبقة على الخشب الممحض. وينبغي أن تؤخذ هذه العوامل بالاعتبار عند تقييم احتمال دخول الآفات الخاضعة للحجر الزراعي وانتشارها.

بشكل عام، كلما ارتفع مستوى تجهيز الخشب أو معالجته بعد الحصاد، تحسن خفض مخاطر الآفات. ولكن تجدر الإشارة إلى أن التجهيز قد يغير طبيعة مخاطر الآفة. فمثلاً، قد تفتـ

عملية تقطيع الخشب إلى رفاقات بحد ذاتها بعض الآفات الحشرية، وخاصة حين يكون حجم الرفacaة المنتجة صغيرة، بينما قد يسهل اتساع مساحة الخشب استعمار الفطريات له. ويقاوِت حجم الرفacaة وفقاً لمواصفات الصناعة ويرتبط عادة بالاستخدام المقصود للرفاقات. أما الآفات المرتبطة بأنسجة خشب محددة (مثل القشرة والخشب العصاري الخارجي) فلا تشكل أية مخاطر حين يتم نزع الأنسجة التي تسكنها خلال عملية التجهيز. وبينما تقييم مخاطر الآفة المرتبطة بالمواد المنزوعة تقييماً منفصلاً إذا ما تقرر نقلها تجارياً، كما لأية سلعة أخرى (كالفلين وحطب الوقود ونشرة القشرة).

من المعروف عن مجموعات الآفات الواردة في الجدول 1 أنها تنتقل مع السلع الخشبية وأنها أثبتت قدرتها على الاستثباب في مناطق جديدة.

الجدول 1- مجموعات الآفات التي يمكن أن ترتبط بالحركة الدولية للأخشاب

المجموعة	الآفات
الآفات والمن	Adelgidae, Aphididae
خفافيش القشرة	Molytinae, Scolytinae
العث غير الأكل للخشب والدبابير	Diprionidae, Lasiocampidae, Lymantriinae, Saturniidae, Tenthredinidae
القرمزيات	Diaspididae
النمل الأبيض والنمل النجار	Formicidae, Kalotermitidae, Rhinotermitidae, Termitidae
الخناكس الأكلة للخشب	Anobiidae, Bostrichidae, Buprestidae, Cerambycidae, Curculionidae, Lyctidae, Oedemeridae, Platypodinae
العث الأكل للخشب	Cossidae, Hepialidae, Sesiidae
ذبابات الخشب	Pantophthalmidae
دبابير الخشب	Siricidae
فطر التقرح البكتيري	Cryphonectriaceae, Nectriaceae
فطر العفن الممرض	Heterobasidion spp.
فطر التبعع الممرض	Ophiostomataceae
فطر الصدا	Cronartiaceae, Pucciniaceae
فطر الذبول الوعائي	Ceratocystidaceae, Ophiostomataceae
الديدان الأسطوانية	Bursaphelenchus cocophilus, B. xylophilus

هناك بعض مجموعات الآفات مثل أغذان الماء والبكتيريا والفيروسات والبلازما النباتية التي يُعرف عنها ارتباطها بالأخشاب، لكن من غير المحتمل أن تستثباب في مناطق جديدة بالانتقال من الخشب المستورد إلى عوائل.

1-1 الأخشاب المستديرة

تنقل معظم الأخشاب المستديرة، بقشرة أو دون قشرة، لتُخضع للتجهيز في مكان الوجهة. وقد يُنشر الخشب لاستخدامه كمادة للبناء (مثل الأطر الخشبية) أو يستخدم لإنتاج مواد خشبية (مثل رفاقات الخشب وصوف الخشب ورقاقات القشرة واللب وحطب الوقود والوقود الحيوي والمنتجات الخشبية المصنعة).

من شأن نزع القشرة عن الأخشاب المستديرة أن يخفض احتمال دخول بعض الآفات الخاضعة للحجر الزراعي وانتشارها. ويعتمد مستوى خفض المخاطر على درجة نزع القشرة والطبقة الخشبية تحتها وعلى مجموعة الآفة. فمثلاً، يخفض النزع الكامل للقشرة بدرجة كبيرة مخاطر إصابة الخشب بمعظم خفافيش القشرة. غير أنه ليس من المرجح أن يؤثر نزع القشرة على الإصابة بأكلات الخشب العميق وبعض أنواع الفطر والديدان الأسطوانية الساكنة في الخشب.

تتأثر مخاطر إصابة الأخشاب المستديرة بآفة إلى حد كبير بالكمية الإجمالية لقشور المتبقية على الخشب منزوع القشرة، الذي يتتأثر بدوره إلى حد كبير بشكل الأخشاب المستديرة والآلات المستخدمة في نزع القشرة وبدرجة أقل، بنوع الشجرة. والمواقع المفضلة لتفشي الخنافس وإيابيتها هي على وجه الخصوص المنطقة المتسعة عند قاعدة الشجرة، خصوصاً حيث توجد دعامات كبيرة للجذور وحول عقد الأغصان.

ترد في الجدول 2 مجموعات الآفات التي يحتمل ارتباطها بالأخشاب المستديرة.

الجدول 2- احتمال ارتباط مجموعات الآفات بالأخشاب المستديرة

السلعة	محتمل	أقل احتمالاً
الأخشاب المستديرة بقشور	الأرقات المن، خنافس القشرة، العث غير الأكل للخشب، القرمزيات، النمل الأبيض والنمل النجار، العث الأكل للخشب، ذباب الخشب، دبابير الخشب، فطر التقرح البكتيري، فطر العفن الممرض، فطر التبغ الممرض، فطر الصدا، فطر الذبول الوعائي، الديدان الأسطوانية	
الأخشاب المستديرة بدون قشور	النمل الأبيض والنمل النجار، الخنافس الأكلة للخشب، العث الأكل للخشب، ذباب الخشب، دبابير الخشب فطر التقرح البكتيري، فطر العفن الممرض فطر التبغ الممرض، فطر الذبول الوعائي، الديدان الأسطوانية	الأرقات والمن، خنافس القشرة، ^٧ العث غير الأكل للخشب، القرمزيات، فطر الصدا

^٧ توجد خنافس القشرة في بعض مراحل حياتها في الخشب الكائن تحت سطح القشرة وفي الطبقة المولدة (الكمبيوم)، ولذا قد تظل بعد تعشير القشرة أو نزعها بالكامل.

2-1 الأخشاب المنشورة

تنقل معظم الأخشاب المنشورة، سواء أكانت بقشرة أم بدونها، دولياً لاستخدامها في تشييد الأبنية وفي صناعة الأثاث وإنتاج مواد التعبئة الخشبية وألواح الخشب المخروطة والملصقات الخشبية والمباعدات الخشبية وروافد السكك الحديدية وغيرها من المنتجات الخشبية المركبة. وقد تشمل الأخشاب المنشورة على قطع مربعة كاملة من الخشب بدون قشرة أو أخشاب مربعة بحافة واحدة منحنية أو أكثر قد تتضمن أو لا تتضمن قشرة يمكن لسماكه قطعة الخشب أن تؤثر على مخاطر الإصابة بالأفاف.

تبدي الأخشاب المنشورة التي نزع بعض قشورها أو نزع كلها مخاطر إصابة بالآفات أدنى بكثير من الأخشاب المنشورة مع قشورها. ويختفي تقليل حجم قطع القشرة المتبقية على الخشب مخاطر الإصابة بالآفات.

تكون مخاطر الآفات المتصلة بالقشرة أيضاً مرهونة بمحتوى الخشب من الرطوبة. الخشب الناتج عن الأشجار الحية المحصودة حديثاً لديه محظوظ من الرطوبة لا يليث أن يقل مع الوقت ليوازي ظروف الرطوبة في الجو المحيط والتي لا يتحمل أن تسمح للكائنات المتصلة بالقشرة بالبقاء على قيد الحياة. ويرد المزيد من المعلومات عن التصدي لمخاطر الآفات من خلال الجمع بين العلاج وخفض الرطوبة في المرفق 2.

ترد مجموعات الآفات التي يحتمل ارتباطها بالأخشاب المنشورة في الجدول 3.

الجدول 3- احتمال ارتباط مجموعات الآفات بالأخشاب المنشورة

السلعة	محتمل	أقل احتمالاً
الأخشاب المنشورة بقشور	خنافس القشرة، النمل الأبيض والنمل النجار، الخنافس الأكلة للخشب، العث الأكل للخشب، ذبابات الخشب، دبابير الخشب، فطر التقرح البكتيري، فطر العفن الممرض ، فطر التبعع الممرض، فطر الصدأ، فطر الذبول الوعائي، الديدان الأسطوانية.	الأرقات والمن، العث غير الأكل للخشب، القرمزيات +
الأخشاب المنشورة دون قشور	النمل الأبيض والنمل النجار، الخنافس الأكلة للخشب، العث الأكل للخشب، ذبابات الخشب، دبابير الخشب، فطر التقرح البكتيري، فطر العفن الممرض ، فطر التقرح البكتيري، فطر التبعع الممرض، فطر الذبول الوعائي، الديدان الأسطوانية	الأرقات والمن، خنافس القشرة، العث غير الأكل للخشب، القرمزيات+، فطر الصدأ

+ قد يكون فطر الصدأ الممرض موجوداً في الأخشاب المنشورة، إلا أن معظمه لا يشكل مخاطر تذكر بسبب الاستخدام المقصود للخشب والقدرة المحددة للفطر على إنتاج أبواغه على الخشب.

+ تزال أنواع كثيرة خلال عملية تربيع الأخشاب ولكن القشور المتبقية قد تتيح مساحة كافية لبعض الأنواع لكي تصمد بعد النشر.

3- مواد خشبية ناتجة عن التجهيز الميكانيكي للخشب (باستثناء النشر)

تؤدي العمليات الميكانيكية التي تقلص حجم القطع الخشبية إلى خفض مخاطر بعض الآفات. لكن من الضروري لآفات أخرى اتخاذ تدابير بديلة لإدارة مخاطر الإصابة بها.

1-3-1 رفاقات الخشب

بالإضافة إلى عوامل مخاطر الآفات المذكورة في القسم 1 المتعلقة بالخشب عموماً، تتفاوت مخاطر الآفات المتعلقة برفاقات الخشب بتفاوت حجمها وتجانسها وأيضاً وفقاً لطريقة تخزينها. ويمكن خفض مخاطر الآفة حين تُنزع القشرة وحين يكون حجم الرفاقة أقل من 3 سم في بعدين اثنين على الأقل (على النحو المبين في الجدول 4 والقسم 2-3). العملية المادية لتقطيع الخشب إلى رفاقات بحد ذاتها تفتّك ببعض الآفات الحشرية، خاصة حين يكون حجم الرفاقة المنتجة صغيراً. ويتفاوت حجم الرفقة وفقاً لمواصفات الصناعة وعادة ما يرتبط بالاستخدام المقصود من الرفاقات (مثل الوقود الحيوي وإنتاج الورق والبستنة وأفرشة الحيوانات). ويتم إنتاج بعض الرفاقات الخشبية باتباع معايير صارمة للجودة للحد من القشور والقطع الصغيرة للغاية.

قد تكون الآفات الحشرية التي توجد عادة تحت القشرة موجودة أيضاً، تبعاً لحجمها، في رفاقات الخشب مع القشرة. كما أن عدة أنواع من فطر العفن الممرض وفطر التقرح البكتيري والديدان الأسطوانية قد تكون موجودة في رفاقات الخشب سواء أكانت بقشرة أم بدونها. ومن غير المحتمل أن تنتشر أبواغ فطر الصدأ الساكنة في الخشب بعد إنتاج الرفاقات.

2-3-1 مخلفات الخشب

يعتبر عادة أن مخلفات الخشب تشكل مخاطر من حيث الآفات، لأنها تتفاوت كثيراً بالحجم وقد تحتوي على قشور أو لا تحتويها. عادة تكون مخلفات الخشب منتجًا جانبيًا للخشب الذي يخضع للتجهيز الميكانيكي خلال إنتاج سلعة مطلوبة؛ ولكن يمكن أن تنقل مخلفات الخشب كسلعة. ترد في الجدول 4 مجموعات الآفات التي يتحمل ارتباطها برفاقات الخشب ومخلفات الخشب.

الجدول 4- مجموعات الآفات التي يحتمل ارتباطها برفاقات الخشب ومخلفات الخشب

السلعه	محتمل	أقل احتمالاً
رفاقات الخشب بقشرة التي يزيد حجمها عن 3 سم في بعدين اثنين على الأقل	خنافس القشرة، النمل الابيض والنمل النجار، الخنافس الاكلة للخشب، العث الاكل للخشب، ذبابات الخشب، دبابير الخشب، فطر التقرح البكتيري، فطر العفن الممرض ^٣ ، فطر التبعع الممرض، فطر الصدأ، فطر الذبول الوعائي، الديдан الاسطوانية	الارقات والمن، العث غير الاكل للخشب، القرمزيات
رفاقات الخشب بدون قشرة والتي يزيد حجمها عن 3 سم في بعدين اثنين على الأقل	النمل الابيض والنمل النجار، الخنافس الاكلة للخشب، العث الاكل للخشب، ذباب الخشب، دبابير الخشب، فطر التقرح البكتيري، فطر العفن الممرض ^٣ ، فطر التبعع الممرض، فطر الذبول الوعائي، الديدان الاسطوانية	الارقات والمن، العث غير الاكل للخشب، القرمزيات، فطر الصدأ ^٤
رفاقات الخشب بقشرة التي يقل حجمها عن 3 سم في بعدين اثنين على الأقل	خنافس القشرة، النمل الابيض والنمل النجار، فطر التقرح البكتيري، فطر العفن الممرض ^٣ ، فطر التبعع الممرض، فطر الصدأ ^٤ ، فطر الذبول الوعائي، الديدان الاسطوانية	الارقات والمن، العث غير الاكل للخشب، القرمزيات، العث الاكل للخشب، ذبابات الخشب، دبابير الخشب
رفاقات الخشب بدون القشرة التي يقل حجمها عن 3 سم في بعدين اثنين على الأقل	النمل الابيض والنمل النجار، فطر التقرح البكتيري، فطر العفن الممرض ³ ، فطر التبعع الممرض، فطر الصدأ ⁴ ، فطر الذبول الوعائي، الديدان الاسطوانية	الارقات والمن، خنافس القشرة، العث غير الاكل للخشب، القرمزيات، العث الاكل للخشب، الخنافس الاكلة للخشب، ذبابات الخشب، دبابير الخشب، فطر الصدأ ⁴
مخلفات الخشب مع او بدون القشرة	الارقات والمن، خنافس القشرة، العث غير الاكل للخشب، القرمزيات، النمل الابيض والنمل النجار، الخنافس الاكلة للخشب، العث الاكل للخشب، ذباب الخشب، دبابير الخشب، فطر التقرح البكتيري، فطر العفن الممرض ³ ، فطر التبعع الممرض، فطر الصدأ ⁴ ، فطر الذبول الوعائي، الديدان الاسطوانية	

³ فطر الصدأ وفطر العفن الممرض قد يكونان موجودين في شحنات رفاقات الخشب أو مخلفات الخشب ولكن من غير المحتمل استتاباهما أو انتشارهما.

3-3-1 نشارة الخشب وصوف الخشب

يبدي كل من نشارة الخشب وصوف الخشب مخاطر إصابة بالآفات أقل مما تبديه السلع المذكورة أعلاه. وفي بعض الحالات، قد ترتبط الفطريات والديدان الاسطوانية بنشارة الخشب. ويعتبر أن صوف الخشب يبدي مخاطر إصابة بالآفات شبيهة بتلك التي تبديها نشارة الخشب.

2- تدابير الصحة النباتية

ينبغي ألا تفرض تدابير الصحة النباتية الموصوفة في هذا المعيار إلا إذا كان لها مبرر فني مبني على تحليل مخاطر الآفات. وهناك عنصر محدد ينبغي النظر فيه من خلال هذا التحليل، وهو كيف أن الاستخدام المقصود للسلعة يمكن أن يخفف المخاطر. ويمكن تطبيق بعض تدابير الصحة النباتية لحماية خشب أنتج في مناطق خالية من الآفات ولكنه قد يكون معرضًا لمخاطر الإصابة في وقت لاحق (مثلاً أثناء التخزين والنقل). وينبغي النظر في الطرق المختلفة للحيلولة دون الإصابة بعد تطبيق تدابير الصحة النباتية؛ مثلاً، تغطية الخشب بالتربولين (القماش المشمع) لدى تخزينه أو استخدام وسائل نقل مغلقة.

قد تفرض المنظمة الوطنية لوقاية النباتات لدى البلد المستورد حدوداً على الإطار الزمني للاستيراد. ويمكن أن تخضع مخاطر الآفة المرتبطة بالأخشاب المنقولة تجاريًا لإدارة المنظمة الوطنية لوقاية النباتات لدى البلد المستورد التي تحدد وقتاً معيناً لكي يجري من ضمنه إرسال الشحنات أو استيرادها (مثلاً خلال الفترة التي تكون فيها الآفة غير نشطة).

ويمكن للمنظمة الوطنية لوقاية النباتات لدى البلد المستورد أن تفرض تطبيق وسائل محددة للتجهيز والمناولة والتخلص من النفايات بشكل مناسب بعد الاستيراد.

إذا ما طلب الامتثال لمتطلبات الاستيراد المتعلقة بالصحة النباتية ذلك، ينبغي على المنظمة الوطنية لوقاية النباتات في البلد المصدر أن تتحقق من تطبيق تدابير الصحة النباتية ومن فعاليتها قبل التصدير وفقاً للمعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 23 (*الخطوط التوجيهية للتفتيش*) والمعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 31 (*منهجيات أخذ العينات*).

إن عدداً كبيراً من الآفات المرتبطة بالخشب خاص بأنواع أو أجناس من الأشجار محددة. ومن هنا، كثيراً ما تكون متطلبات الصحة النباتية للأخشاب محددة بالجنس أو النوع. ولذا فإن المنظمة الوطنية لوقاية النباتات في البلد المصدر، ينبغي أن تتحقق من أن الخشب في الشحنة يمثل لمتطلبات الاستيراد المتعلقة بالصحة الخاصة بالنوع أو العرق، حيث يكون مثل هذه المتطلبات موجوداً.

تصف الأقسام التالية الخيارات الأكثر استخداماً لتدابير الصحة النباتية.

1-2 إزالة القشرة

توجد بعض الآفات الخاضعة للحجر الزراعي في القشرة أو تحتها مباشرة. ولخفض مخاطر الآفات، قد تطلب المنظمة الوطنية لوقاية النباتات لدى البلد المستورد نزع القشرة (إنتاج خشب خال من القشرة أو منزوع القشرة) كأحد متطلبات الصحة النباتية للاستيراد، وفي حالة الخشب المنزوع القشرة، قد تحدد المنظمة المذكورة مستويات للتحمّل لما يتبقى من القشور. وحيثما تبقى هناك قشور مع الخشب، يمكن استخدام المعالجات لخفض مخاطر الآفة المرتبطة بالقشرة.

1-1-2 الخشب منزوع القشرة

يؤدي النزع الكامل للقشرة عن الأخشاب المستيرة والسلع الخشبية الأخرى إلى نزع طبقة من المادة التي قد ينمو عليها عدد كبير من الآفات ويزيل مناطق كبيرة من السطوح غير السوية التي تختبئ فيها آفات أخرى.

إن نزع القشرة يتخلص من الآفات الموجودة بشكل عام على سطح القشرة مثل الأرقات والمن وحشرات القرمزيات والعتير غير الأكل للخشب في بعض مراحل حياتها. علاوة على ذلك، فإن نزع القشرة يقضي على معظم خناكس القشرة كما يحول دون تفشي الآفات الأخرى التي تصيب الخشب بعد الحصاد، مثل دبابير الخشب وأكلات الخشب الكبيرة الحجم (كفصيلة المنشاريات).

حيث تتطلب المنظمة الوطنية لوقاية النباتات في البلد المستورد أن يكون الخشب منزوع القشرة، ينبغي على السلعة أن تفي بتعريف الخشب المنزوع القشرة الوارد في المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 5 (انظر المرفق 1 لتوسيع القشرة النامية داخلياً وجيوب القشرة). أما القشرة المحاطة تماماً بطبقة مولدة (كامبيوم)، فتبدي مخاطر آفات أقل بكثير من تلك التي يبديها سطح القشرة. وفي حالات كثيرة قد يحمل الخشب علامات تدل على وجود طبقة مولدة (كامبيوم) قد تظهر كنسيجبني فاسد اللون على سطح الخشب، ولكن هذا لا ينبغي أن يعتبر دليلاً على وجود القشرة ولا يفرض مخاطر ناجمة عن الآفات المرتبطة بالقشرة. ينبغي للتحقق من الخشب منزوع القشرة أن يؤكد ببساطة انعدام وجود آية علامة على طبقة النسيج فوق الطبقة المولدة (الكامبيوم).

2-1-2 الخشب المقصور

قد لا تؤدي العملية الميكانيكية المستخدمة في النزع التجاري لقشرة الخشب إلى إزالة القشرة تماماً، وقد تبقى بعض أجزاء القشرة. ويحدد عدد وحجم أي من الأجزاء المتبقية مدى خفض مخاطر الآفات المرتبطة بالقشرة (مثل خنافس القشرة والأرقات والمن والقرمزيات).

يحدد بعض البلدان في أنظمته مستويات التسامح تجاه القشرة في الأخشاب المستوردة. ومن شأن التقشير ضمن حدود التسامح الموصوفة أدناه خفض مخاطر الآفات التي تستكمل دوراتها الحياتية في الخشب غير المعالج.

عندما يكون ذلك مبرراً تقنياً وتنص عليه المنظمة الوطنية لوقاية النبات كمتطلب من متطلبات الاستيراد المتعلقة بالصحة النباتية، ينبغي على المنظمة الوطنية لوقاية النباتات في البلد المصدر أن تضمن استيفاء تلك المتطلبات الخاصة بالخشب منزوع القشرة.

فمثلاً، لتخفيف مخاطر وجود خنافس القشرة يجوز أن يبقى أي عدد من أجزاء القشرة الصغيرة التي يتم تحديدها بالنظر وتمييزها بوضوح إذا كانت:

- بعرض يقل عن 3 سم (بغض النظر عن طولها)
- أو بعرض يزيد على 3 سم، وتقل المساحة الكلية لكل جزء مفرد من أجزاء القشرة عن 50 سم مربع.

2-2 المعالجات

يمكن استخدام المعالجات المقبولة دولياً الواردة في ملحق المعيار الدولي 28 (معاملات الصحة النباتية للآفات الخاضعة لقواعد الحجر الزراعي). كمتطلبات الصحة النباتية للاستيراد لبعض السلع الخشبية.

تتأثر فعالية جميع المعالجات الكيميائية بعمق الاختراق، الذي يتفاوت حسب برنامج المعالجة (مثل الجرعة ودرجة الحرارة)، وأنواع الخشب ومحتوى الرطوبة، وفي كثير من الأحيان يؤدي نزع القشرة إلى تحسين اختراق المعالجات الكيميائية للخشب وقد يخفف من احتمال إصابة الخشب المعالج.

ينبغي تطبيق المعالجات تحت إشراف المنظمة الوطنية لوقاية النباتات للبلد المصدر أو بتصريح منها لاستيفاء متطلبات الصحة النباتية للاستيراد. وينبغي أن تقوم المنظمة الوطنية لوقاية النباتات في البلد المصدر بوضع ترتيبات تضمن أن تطبق المعالجات على النحو المحدد، كما ينبغي عليها، عند الاقتضاء، وعن طريق التفتيش أو الاختبار التحقق قبل إصدار شهادة الصحة النباتية من أن الخشب خال من الآفات المستهدفة. ويمكن أيضاً استعمال أدوات محددة (مثلاً مقياس الحرارة الإلكتروني وكروماتوغراف الغازات ومقياس الرطوبة الموصول بأجهزة للتسجيل) للتحقق من تطبيق المعالجة.

ينبغي اعتبار وجود آفات حية من الآفات الخاضعة للحجر الزراعي دليلاً على عدم امتثال الشحنة، باستثناء الأخشاب المعالجة بالإشعاع، الذي قد تنتهي عنه آفات حية لكنها عقيمة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن العثور على كائنات مؤشرة ملائمة (أو مخلفات حديثة العهد) يشير، تبعاً لنوع المعالجة، إما إلى فشل المعالجة أو إلى عدم الامتثال.

قد لا يكون بعض أنواع المعالجات فعالاً ضد جميع الآفات. وترتدى في المرفق 2، إرشادات إضافية بشأن المعالجات التي يمكن استخدامها لتخفيف مخاطر الآفات التي تصيب الخشب.

3-2 تقطيع الخشب إلى رقاقات

يمكن لعملية تقطيع الخشب إلى رقاقات أو طحنه ميكانيكياً أن تكون فعالة في تدمير معظم الآفات التي تسكن الخشب. ومن شأن خفض حجم الرقاقة إلى 3 سم كحد أقصى في بُعدين اثنين على الأقل تخفيف مخاطر الآفات التي يمتهنها معظم الحشرات. غير أن الفطر والديدان الأسطوانية والحرشات الصغيرة، مثل بعض أنواع Scolytinae أو أنواع Buprestidae أو أنواع Bostrichidae أو الـ Anobiidae قد تظل تشكل مخاطر آفات.

4-2 التفتيش والاختبار

يمكن الاستعانة بالتفتيش أو الاختبار للكشف عن آفات محددة مرتبطة بالخشب. وتبعاً للسلعة الخشبية، قد يكشف التفتيش علامات أو أعراض محددة للآفات. فمثلاً، قد يكشف التفتيش والاختبار عن وجود خنافس القشرة وأكلات الخشب وفطر العفن على الأخشاب المستديدة والأخشاب المنشورة. ويمكن إجراء التفتيش في نقاط عدّة على امتداد عملية الإنتاج لتحديد ما إذا كانت تدابير الصحة النباتية المطبقة فعالة.

حين تطبق وسائل التفتيش يفترض بها أن تتيح كشف أية إشارات وأعراض للآفات الخاضعة للحجر الزراعي. ويمكن أن يشير كشف بعض كائنات أخرى معينة إلى فشل المعالجة. وقد تشمل العلامات بعض المخلفات الحديثة لحشرات أو كلوماً أو أنفاقاً لأكلات الخشب وبنقعات على سطح الخشب ناجمة عن الفطر، وفراغات أو إشارات إلى تعفن الخشب. وتتضمن علامات تعفن الخشب تقرحات نازفة، وخطوطاً بنية طويلة متقطعة على الخشب العصاري الخارجي وفساد لون الخشب العصاري الخارجي؛ ومناطق لينة، وانتفاخ غير واضح السبب، ودفقاً للراتنج على الحطبات، وتشققات وحلقات وجروحاً في الأخشاب المنشورة. وحيثما تكون هناك قشرة يمكن نزعها بحثاً عن علامات تغذية وأنفاق الحشرات، وعن تقع أو خطوط على الخشب الكامن تحتها كدلائل على وجود آفات. ويمكن استخدام وسائل سمعية أو حسية أو غيرها أيضاً لغايات الكشف. وينبغي القيام بمعاينات أكثر للتحقق مما إذا كانت الآفات الخاضعة للحجر الزراعي أو الكائنات المؤشر موجودة، مثل التتحقق من دورات حياة الحشرات الحية كقتل البيض والشرانق.

قد تستخدم الاختبارات للتحقق من تطبيق أو تأثير تدابير الصحة النباتية الأخرى مثل المعالجات. ويكون إجراء الاختبارات في العادة مقتصرًا على الكشف عن الفطر والديدان الأسطوانية. مثلاً يمكن لتحديد وجود الديدان الأسطوانية، التي هي آفات خاضعة للحجر، أن يتم عبر الاستعانة بمزيج من التقنيات المجهرية والجزيئية على عينات خشبية مأخوذة من الشحنات.

ترد التوجيهات بشأن التفتيش وأخذ العينات في كل من المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 23 والمعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 31.

5-2 المناطق الداخلية من الآفات وأماكن الإنتاج الداخلية من الآفات ومناطق ينخفض فيها انتشار الآفات

تمكن لإدارة مخاطر الآفات المرتبطة بالخشب إقامة مناطق داخلية من الآفات وأماكن إنتاج خالية من الآفات ومناطق ينخفض فيها انتشار الآفات، حيثما يكون ذلك ممكناً. وترد التوجيهات ذات الصلة في المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 4 (متطلبات إنشاء مناطق داخلية من الآفات)، وفي المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 8 (تحديد حالة الآفات في منطقة ما)، والمعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 22 (شروط إنشاء مناطق ينخفض فيها انتشار الآفات) والمعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 29 (الاعتراف بالمناطق الداخلية من الآفات والمناطق التي ينخفض فيها انتشار الآفات). غير أن استخدام أماكن إنتاج خالية من الآفات أو موقع خالية من الإنتاج قد يقتصر على حالات محددة، كالمزارع الحرجية الكائنة ضمن المناطق الزراعية أو الضواحي. ويمكن الاستعانة بالمراقبة البيولوجية اختيارياً لتحقيق المتطلبات بالنسبة إلى منطقة ينخفض فيها انتشار الآفات.

6-2 نهج النظم

تمكن إدارة مخاطر الآفات المرتبطة بالحركة الدولية للأخشاب بفعالية، عبر تطوير نهج النظم التي تدمج تدابير إدارة مخاطر الآفات بحيث تتكامل بعضها مع بعض على النحو الموصوف في المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 14 (استخدام التدابير المتكاملة لإدارة مخاطر الآفات في إطار منهج النظم). ويمكن لنظم إدارة الغابات الحالية، لمرحلتي ما قبل وما بعد الحصاد، بما في ذلك التجهيز والتخزين والنقل، أن تشمل أنشطة مثل اختيار المواقع في مناطق خالية من الآفات، والتقييس لضمان أن يكون الخشب خالياً من الآفات، والمعالجات، والحواجز المادية (مثل تغليف الخشب)، وتدابير أخرى، تكون فعالة في إدارة مخاطر الآفات عندما تُدمج بتبني نهج نظمي.

تصعب إدارة بعض من مخاطر الآفات المرتبطة بالأخشاب المستديرة (خاصة مخاطر أكلات عمق الخشب وبعض الديدان الاسطوانية) من خلال تطبيق تدبير واحد من تدابير الصحة النباتية. وفي تلك الحالات، يمكن تطبيق مزيج من عدة تدابير للصحة النباتية في نهج النظم

وفقاً للمعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 14، قد تطبق المنظمة الوطنية لوقاية النباتات في البلد المستورد تدابير إضافية ضمن أراضيها على نقل الخشب أو تخزينه أو تجهيزه بعد الاستيراد. فمثلاً، يمكن السماح بدخول الأخشاب المستديرة بقشور التي قد تعيش فيها خنافس قشرة تكون آفات خاضعة للحجر الزراعي إلى البلد المستورد فقط خلال الفترة التي لا تكون فيها نشطة. وفي هذه الحالة قد يكون من المطلوب أن يجري تجهيز الخشب في البلد المستورد للتخلص من مخاطر الآفة قبل أن تتطور هذه الكائنات إلى مرحلة النشاط. ويمكن استخدام المتطلبات التي تقضي بنزع قشرة الخشب واستعمال القشرة أو مخلفات الخشب كوقود حيوي أو إتلافها بطريقة أخرى قبل بدء مرحلة نشاط الخنافس، للحيلولة دون نشوء مخاطر دخول وانتشار آفات خنافس القشرة الخاضعة للحجر الزراعي.

ويمكن إدارة مخاطر الآفة المرتبطة بالفطر بشكل فعال من خلال اختيار الخشب من مناطق خالية من الآفات أو أماكن إنتاج خالية من الآفات، وتطبيق تدابير الحصاد المناسبة (مثل انتقاء الخشب الخالي من العفن بالمعاينة البصرية من علامات الإصابة) ووضع مبيد للفطريات على سطح الخشب.

-3 الاستخدام المقصود

يمكن لاستخدام المقصود للخشب أن يؤثر في مستوى مخاطر الآفة المتعلقة به، لأن بعض استخداماته المقصودة (مثل استعمال الأخشاب المستديرة كحطب للوقود ورقاقات الخشب كوقود حيوي أو لأغراض البستنة) قد تزيد من احتمال دخول وانتشار الآفات الخاضعة للحجر الزراعي (المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 32 (تصنيف السلع تبعاً لمخاطر الآفات التي تنطوي عليها)). وبالتالي تتوجب مراعاة الاستخدام المقصود عند تقييم أو إدارة مخاطر الآفات المرتبطة بالحركة الدولية للأخشاب.


-4 عدم الامتثال

ترد في المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 13 (خطوط توجيهية للإبلاغ عن حالات عدم التقييد بشروط الصحة النباتية والإجراءات الطارئة) والمعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 20 (الخطوط التوجيهية لتطبيق نظام تطبيق لوائح الصحة النباتية على الواردات) معلومات متعلقة بعدم الامتثال وإجراءات الطوارئ.

أدرج هذا المرفق لأغراض مرجعية فقط وهو لا يشكل جزءاً ملزاً لهذا المعيار.

المرفق 1: صور توضيحية للقشرة والخشب

تعد أدناه صور توضيحية تساعد على التمييز بشكل أفضل بين الخشب والطبقة المولدة (الكامبيوم) من جهة والقشرة من جهة أخرى.



الشكل 1- مقطع مستعرض لخشب مستدير
الصورة تقدمة من Sela، الوكالة الكندية للتفتيش على الأغذية.



الشكل 2- مقطع مستعرض لخشب مستدير
الصورة تقدمة من Sela، الوكالة الكندية للتفتيش على الأغذية.



الشكل 3- خشب منشور.
الصورة تقدمة من Canadian Lumber Standards Accreditation Board، C. Dentelbeck، أوتاوا

المرفق 2: المعالجات التي يمكن استخدامها للتخفيف من مخاطر الآفات على الخشب

- التبخير

يمكن استخدام التبخير في مكافحة الآفات المرتبطة بالخشب.

على الرغم من الفعالية المثبتة لبعض مواد التبخير ضد بعض الآفات فهناك حدود مفروضة على استخدامها بغرض خفض مخاطر الآفات. وتنقاوت مواد التبخير في قدرتها على اختراق الخشب وبالتالي فإن بعضها لا يكون فعالاً إلا ضد الآفات الموجودة في القشرة أو عليها أو تحتها مباشرة. وقد يكون عمق الاختراق لبعض مواد التبخير مقتراً على حوالي 10 سم من سطح الخشب. ويكون الاختراق أكبر في الخشب الجاف منه في الخشب المقطوع حديثاً.

بالنسبة إلى بعض مواد التبخير، يمكن لنزع القشرة قبل التبخير أن يحسن فعالية المعالجة.

قبل اختيار التبخير كتدبير للصحة النباتية، على المنظمات الوطنية لوقاية النباتات أن تأخذ بالاعتبار توصية هيئة تدابير الصحة النباتية ، الاستعاضة عن استخدام بروميد الميثيل أو الحد من استخدامه كتدبير للصحة النباتية (هيئة تدابير الصحة النباتية 2008)

- الرش أو الغمس

يمكن الاستعانة برش المواد الكيميائية أو غمسها لمكافحة الآفات المرتبطة بالخشب، باستثناء رفاقات الخشب والنشارة وصوف الخشب والقشرة ومخلفات الخشب.

خلال عملية الرش أو الغمس توضع المواد الكيميائية السائلة أو المذوبة على الخشب بدرجة الضغط الطبيعية للجو. وتؤدي هذه المعالجة إلى اختراق محدود للخشب العنصري. ويعتمد الاختراق على أنواع الخشب ونوع الخشب (الخشب العنصري الخارجي والخشب الداخلي). وخصائص المنتج الكيميائي. وإن كلّا من نزع القشرة واستعمال الحرارة يزيدان من عمق اختراق الخشب العنصري. وقد لا يحول المكوّن الناشط للمنتج الكيميائي دون ظهور الآفات الموجودة في الخشب. وتعتمد حماية الخشب المعالج من الإصابة اللاحقة للآفات علىبقاء الطبقة الواقية من المنتج الكيميائي سليمة. وقد تحدث إصابة لبعض الآفات ما بعد العلاج (مثل آكلات الخشب الجاف) في حال تعرض الخشب لمزيد من النشر بعد العلاج، وفي حال لم ينفذ المنتج الكيميائي إلى جزء من المقطع المستعرض.

- التشبيع بالضغط الكيميائي

يمكن استخدام التشبيع بالضغط الكيميائي لمكافحة الآفات المرتبطة بالخشب، باستثناء رفاقات الخشب والنشارة وصوف الخشب والقشرة ومخلفات الخشب.

يؤدي استخدام مادة حافظة بواسطة الضغط الخوائي أو الضغط أو عمليات المعالجة الحرارية إلى منتج كيميائي يوضع على سطح الخشب والدفع به إلى عمق ذلك الخشب.

التشبيع بالضغط الكيميائي يستعمل عادة لحماية الخشب من الإصابة بالآفات بعد المعالجات الأخرى. وقد يكون له مفعول معين أيضاً في الحيلولة دون ظهور الآفات التي نجت من المعالجة على سطح الخشب. إن اختراق المادة الكيميائية لداخل الخشب يفوق بكثير ما يحصل مع الرش أو الغمس، ولكن ذلك يعتمد على أنواع الخشب وخصائص المنتج الكيميائي. يكون الاختراق عموماً في أنحاء الخشب العنصري ومن خلال قسم محدود من الخشب الداخلي. ويجوز لنزع القشرة أو التقسيب الميكانيكي للخشب أن يحسّناً من اختراق المنتج الكيميائي له. ويعتمد الاختراق أيضاً على محتوى الخشب من الرطوبة، ولذا فإن تجفيف الخشب قبل إخضاعه للتشبيع بالضغط الكيميائي قد يحسن هو أيضاً نسبة الاختراق. ويكون التشبيع بالضغط الكيميائي فعالاً ضد بعض الحشرات الآكلة للخشب. وفي بعض عمليات التشبيع، تستعمل المادة الكيميائية على درجة حرارة مرتفعة بشكل كاف بحيث توازي المعالجة الحرارية. وتعتمد حماية الخشب المعالج من أي إصابة لاحقة،

على بقاء الطبقة الواقية من المنتج الكيميائي سليمة. وقد تحصل إصابة من جانب بعض الآفات في مرحلة ما بعد المعالجة (مثل أكلات الخشب الجاف) في حال تم نشر الخشب بعد المعالجة وعدم اخترق المنتج الكيميائي لجزء من المقطع المستعرض

4- المعالجة بالحرارة

يمكن استخدام المعالجة بالحرارة في مكافحة الآفات المرتبطة بكافة السلع الخشبية. ووجود القشرة أو غيابها لا يؤثران مطلقاً على فعالية العلاج الحراري ولكنه ينبغي أن تؤخذ بالاعتبار في حال حدد جدول للعلاج الحراري المقاسات القصوى للخشب الخاضع للعلاج.

تتطوّي عملية المعالجة بالحرارة على تحمية الخشب حتى درجة حرارة معينة ولفترات زمنية معينة (مع أو بدون ضبط الرطوبة) خاصة بالأفة المستهدفة. وإن الفترة الزمنية الدنيا للمعالجة في غرفة الحرارة المطلوبة لبلوغ درجة الحرارة على امتداد الخشب، رهن مقاسات قطع الخشب ونوعها وسمكها ومحتوها من الرطوبة، فضلاً عن سعة الحجرة وعوامل أخرى. ويمكن توليد الحرارة داخل حجرة تقليدية للتحميّة أو عبر وسيلة العازل الكهربائي أو الطاقة الشمسية أو سواها من وسائل التسخين.

تنقاوت درجة الحرارة المطلوبة لقتل الآفات المرتبطة بالخشب لأن القدرة على تحمل الحرارة تختلف بين نوع وآخر. وقد يبقى الخشب المعالج بالحرارة عرضة للإصابة بأذى العفن الشائع خاصة إذا ما بقي محتواه من الرطوبة عالياً؛ غير أن العفن لا ينبغي أن يعتبر مثار قلق في ما يتعلق بالصحة النباتية.

5- التجفيف في القمان

يمكن استعمال التجفيف في القمان للأخشاب المنشورة والكثير من السلع الخشبية الأخرى.

التجفيف في القمان عملية يُخفض خلالها محتوى الرطوبة في الخشب وذلك عبر استعمال الحرارة، لبلوغ محتوى الرطوبة المطلوب للاستخدام المقصود للخشب. ويمكن اعتبار التجفيف في القمان معالجة حرارية في حال تُفذ على درجات حرارة كافية ولوفرات زمنية مناسبة. وفي حال تعذر بلوغ درجات الحرارة الثالثة عبر الطبقات المعنية من الخشب فإن التجفيف في القمان لوحده لا يعدّ معالجة من معالجات الصحة النباتية.

يعتمد بعض الأنواع في مجموعات الآفات المرتبطة بالسلع الخشبية على الرطوبة وبالتالي قد تكون غير ناشطة خلال عملية التجفيف في القمان. كما أن التجفيف في القمان يغيّر بشكل دائم البنية الفيزيقية للخشب ما يحول دون ارتشاف الرطوبة الكافية لإعاقة الآفات الحالية وتخفيف حالات الإصابة في مرحلة ما بعد الحصاد. غير أن آفات فردية لبعض الأنواع قد تكون قادرة على استكمال دوراتها الحياتية في البيئة الجديدة ذات محتوى الرطوبة الأقل. وفي حال استعيدت ظروف الرطوبة المناسبة فإن الكثير من الفطريات والديدان الأسطوانية وبعض أنواع الحشرات قد تكون قادرة على مواصلة دوراتها الحياتية أو إصابة الخشب بعد المعالجة.

6- التجفيف بالهواء

بالمقارنة بالتجفيف في القمان، يقلل التجفيف بالهواء محتوى الخشب من الرطوبة ولكن فقط إلى مستويات الرطوبة الطبيعية في البيئة المحيطة وهو وبالتالي أقل فعالية بوجه مجموعة واسعة من الآفات. وتكون مخاطر الآفات المتبقية بعد المعالجة رهن فترة التجفيف ومحتوى الرطوبة والاستخدام المقصود للخشب. ولا ينبغي أن يعتبر خفض الرطوبة من خلال التجفيف بالهواء وحده تدبيراً من تدابير الصحة النباتية.

على الرغم من أن خفض الرطوبة من خلال التجفيف بالهواء أو التجفيف في القمان وحدهما قد لا يكون من تدابير الصحة النباتية، فإن الخشب المجفف إلى ما دون نقطة تشبع

الألياف، قد لا يشجع الإصابة من عدد كبير من الآفات. وبالتالي فإن احتمال إصابة الخشب المجفف متدن جداً في ما يخص عدداً كبيراً من الآفات.

-7 التشيع

إن تعريض الخشب للإشعاع المؤين (مثل الإلكترونات المسربعة والأشعة السينية وأشعة غاما) قد يكون كافياً لقتل أو تعقيم أو تعطيل الآفات (المعيار الدولي 18 (الخطوط التوجيهية لاستخدام الإشعاع في الصحة النباتية))

-8 المعالجة بالجو المعدل

يجوز استعمال المعالجات بالجو المعدل على الأخشاب المستديرة والأخشاب المنشورة ورفاقات الخشب والقشرة.

في مثل تلك المعالجات يعرض الخشب للأجواء المعدلة (مثل، الذي يقل فيه الأكسجين ويعلو ثاني أكسيد الكربون) على فترات طويلة من الوقت بغية قتل الآفات أو تعطيلها. ويمكن للجو المعدل أن يولد بشكل مصطنع داخل غرف الغاز أو أن يحصل بشكل طبيعي، مثلاً خلال تخزين المياه أو حين يكون الخشب ملفوفاً بخلاف بلاستيكي محكم.

-9 المراجع

هيئة تدابير الصحة النباتية 2008. الاستعاضة عن استخدام بروميد الميثيل أو الحد من استخدامه كتدبير للصحة النباتية. توصية هيئة تدابير الصحة النباتية. في تقرير الدورة الثالثة لهيئة تدابير الصحة النباتية- روما، 7- 11 أبريل/نيسان 2008، المرفق 6، روما، الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة الأغذية والزراعة (<https://www.ippc.int/publications/500/>) (سجل آخر دخول بتاريخ 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2016).

الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات

الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات هي اتفاقية صحة نباتية دولية تهدف إلى حماية النباتات المزروعة و النباتات البرية عن طريق منع دخول و انتشار الآفات. تزداد حجم السفرات و التجارة الدولية بشكل كبير عن ذي قبل. فعندما يتنقل البشر والسلع حول العالم فإن الكائنات التي تمثل خطراً على النباتات تتنقل معهم.

تنظيم:

- هناك أكثر من 180 طرف متعاقد في الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات.
- لكل طرف متعاقد منظمة قطرية لوقاية النباتات و نقطة اتصال رسمية للاتفاقية الدولية لوقاية النباتات.
- تعمل تسعة منظمات إقليمية لوقاية النباتات لتيسير تنفيذ الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات في البلدان.
- تتواصل الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات مع المنظمات الدولية ذات الصلة للمساعدة في بناء القرارات الإقليمية و الوطنية.
- أمانة الاتفاقية تقدمها منظمة الأغذية و الزراعة للأمم المتحدة (الفاو).



الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات
Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italy
رقم الهاتف: +39 06 5705 4812
رقم الفاكس: +39 06 5705 4819
البريد الإلكتروني: ippc@fao.org
الموقع الإلكتروني: www.ippc.int