



МСФМ 28
Приложение [XX]

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ПО ФИТОСАНИТАРНЫМ МЕРАМ

МСФМ 28 ФИТОСАНИТАРНЫЕ ОБРАБОТКИ

ФО [XX]: Обработка горячим паром против *Bactrocera cucurbitae* на *Cucumis melo* var. *reticulatus* (201[X] год)

Область применения обработки

Данный вид обработки предполагает обработку горячим паром плодов *Cucumis melo* var. *reticulatus* (дыня сетчатая), что приводит к гибели яиц и личинок дынной плодовой мухи (*Bactrocera cucurbitae*) с заявленной эффективностью¹.

Описание обработки

Наименование обработки	Обработка горячим паром против <i>Bactrocera cucurbitae</i> на <i>Cucumis melo</i> var. <i>reticulatus</i>
Действующее вещество	Н/П
Тип обработки	Физическая (паровое нагревание)
Вредный организм-мишень	<i>Bactrocera cucurbitae</i> (Coquillett) (Diptera: Tephritidae)
Целевые подкарантинные материалы	Плоды дыни сетчатой (<i>Cucumis melo</i> var. <i>reticulatus</i>)

¹ Область применения фитосанитарных обработок не включает вопросы касательно регистрации пестицидов и иных внутренних требований договаривающихся сторон при утверждении обработок. Утвержденные МККЗР обработки также могут не предоставлять информацию о специфическом воздействии на здоровье человека и безопасность пищевой продукции, которая подлежит рассмотрению в соответствии с внутренними процедурами до того, как договаривающиеся стороны утвердят обработку. Кроме того, прежде чем вводить применение обработок на международном уровне, следует изучить их потенциальное воздействие на качество продукции для некоторых товаров-хозяев. Однако оценка любого воздействия обработки на качество товаров может потребовать дополнительного рассмотрения. Договаривающаяся сторона не несет никаких обязательств в отношении утверждения, регистрации или внедрения обработок для применения на своей территории.

Порядок обработки

Экспонирование в камере паровой термообработки:

- при, как минимум, 95-процентной относительной влажности;
- повышение температуры воздуха от комнатной до более чем 46°C;
- от трех до пяти часов, пока сердцевина плода не достигнет температуры 45°C;
- после этого 30 минут при, как минимум, 95-процентной относительной влажности и температуре воздуха 46°C, минимальная температура мякоти плода – 45°C.

После окончания обработки дыни следует охладить при комнатной температуре воздуха, чтобы температура их сердцевины упала ниже 30°C.

Уровень эффективности и достоверности обработки: эффективная доза (ED)_{99,9889} при уровне достоверности 95%.

Во время обработки следует постоянно отслеживать температуру товара и относительную влажность с интервалом <1 минуты, показатели не должны опускаться ниже указанного уровня.

Другая важная информация

При оценке данной обработки Техническая группа экспертов по фитосанитарным обработкам (ТГЭФО) рассмотрела вопросы, связанные с температурными режимами и поддержанием температурных условий, с учетом работы Халлмана и Мэнгана (1997 год).

Данный порядок обработки был основан на работе Ивата и др. (1990 год.) и разработан при использовании сорта "Earl's Favourite" *Cucumis melo* var. *reticulatus*.

Плоды могут быть повреждены, если температура сердцевины превысит 47°C.

Справочные материалы

Hallman, G.J. & Mangan, R.L. 1997. Concerns with temperature quarantine treatment research. In G.L. Obenauf, ed. *Proceedings of the 1997 Annual International Research Conference on Methyl Bromide Alternatives and Emissions Reduction*, San Diego, CA, USA, Nov. 3–5. pp. 79-1–79-4. Доступно на сайте <http://www.mbao.org/mbrpro97.html> (доступ осуществлен в сентябре 2010 года).

Iwata, M., Sunagawa, K., Kume, K. & Ishikawa, A. 1990. Efficacy of vapour heat treatment on netted melon infested with melon fly, *Dacus cucurbitae* Coquillett (Diptera: Tephritidae). *Research Bulletin of the Plant Protection Service, Japan*, 26: 45-49.

История публикации

История публикации не является официальной частью стандарта.

Обработка направлена ТГЭФО в 2006 году.

Текст обновлен в июле 2010 года.

Утверждена КС посредством электронного принятия решений в мае 2011 года для направления на КЧ.

2011-07 Консультация членов в июне 2011 года.

2011-12 Направление ответов ТГЭФО на комментарии в КС.

2012-05 КС посредством электронного принятия решений вернул обработку ТГЭФО.

2012-12 Пересмотр ТГЭФО.

2013-02 Письмо направившему обработку.

2013-07 ТГЭФО рассмотрела ответ направившего обработку и рекомендовала обработку КС для принятия на КФМ.

МСФМ 28. 2007: Приложение [XX] Обработка горячим паром против *Bactocera cucurbitae* на *Cucumis melo* var. *reticulatus* (201[X] год), Рим, МККЗР, ФАО.

История публикации: Последние изменения в октябре 2013 года.